

## Ichneumoniens d'Espagne et des Canaries [HYMÉN.]

par l'abbé V. BERTHOUMIEU.

✓ **Ichneumon lateritius**, nov. sp. — ♀. Voisin de *I. ochropis* Gml. Tête un peu plus large que le thorax, mais rétrécie inférieurement et en arrière; clypéus convexe, largement arrondi au bord, et grossièrement ponctué; milieu de la face un peu proéminent; orbites du front et marge du cou blancs. Antennes grêles, 13<sup>e</sup> article carré, filiformes-aiguës, annelées de blanc. Prothorax, métathorax et métapleures rouges; postécusson et écusson blancs, celui-ci gibbeux; aréa supéro-médiane semi-ovale, les supéro-externes divisées. Abdomen subcylindrique, postpétiole presque lisse, convexe, avec une fovéole médiane; gastrocèles en sillon transversal; segments 2-5 et marge du postpétiole roux, 6-7 blancs; tarière saillante de 2 mill. Pieds noirs; stigma brun-roux, l'aréole deltoïde. — Long. : 10 mill.

Patrie : Nord de l'Espagne (P. Antiga.).

✓ **I. reconditus**, nov. sp. — ♀. Tête et thorax entièrement noirs; tête rétrécie inférieurement et sur les côtés; antennes grêles, striées, noires avec deux taches blanches, vestiges d'un anneau. Aréa supéro-médiane en forme de croissant, les supéro-externes divisées; spiracules linéaires. Abdomen roux obscur, 1<sup>er</sup> et 7<sup>e</sup> segments noirs; postpétiole finement ponctué; gastrocèles très petits; tarière saillante. Pieds noirs; cuisses postérieures rousses. Stigma roux. — Long. : 6-7 mill.

Patrie : Saragosse (Cabrera).

✓ **Neotypus Cabrerai**, nov. sp. — ♀. Tête rouge; clypéus, mandibules, occiput et antennes noires, celles-ci annelées de blanc. Ponctuation des joues et du clypéus serrée. Thorax rouge, suture du méso- et du métanotum et le sternum noirs. Écusson très convexe. Aréa supéro-médiane transversale; spiracules ovales. Abdomen noir, largement ovale-aigu, fortement ponctué; postpétiole marginé de roux; gastrocèles médiocres; 2<sup>e</sup> segment avec deux points blancs aux angles, 4-7 marginés de blanc. Pieds noirs. Stigma brun. — Long. : 7 mill.

Patrie : île de Ténériffe (Cabrera).

✓ **Platylabus calidus**, nov. sp. — ♂ ♀. Corps grêle, noir. Lignes aux orbites internes et externes des yeux, devant et sous les ailes. écailles et écusson blancs. Front non canaliculé; antennes annelées de blanc; le ♂ a les palpes, les mandibules et le devant du scape blancs.

Aréa supéro-médiane carrée, les supéro-externes non divisées; spiracules ovales. Abdomen noir, subtilement ponctué; postpétiole lisse, bicaréné; gastrocèles assez grands, peu profonds. Pieds et stigma roux, taches des hanches antérieures blanches. — Long. : 8 mill.

Patrie : Espagne (Cabrera).

✓ **Pheogenes nigellus**, nov. sp. — ♂. Tête noire, plus large que le thorax; mandibules à dents subégales; clypéus fortement séparé de la face; antennes rousses en dessous. Thorax noir, aréa supéro-médiane un peu plus longue que large. Abdomen noir, segments 2-3 marginés de roux; postpétiole lisse; impression basale du 2<sup>e</sup> segment très faible. Pieds noirs, tibias roux. — Long. : 4 mill.

Patrie : Espagne (Cabrera).

✓ **Ischnogaster Cabrera**, nov. sp. — ♂. Corps grêle. Tête élargie sur les côtés, plus large que le thorax; mandibules épaisses, à dents subégales. Antennes courtes, noires et roussâtres en dessous. Lignes devant les ailes, écailles et toutes les hanches blanches. Mésonotum roux; aréa supéro-médiane un peu plus longue que large. Écusson, postécusson et extrémité du métanotum roux. Abdomen roux, 1<sup>er</sup> segment et le dos des suivants noirs. Postpétiole aciculé, gastrocèles nuls. Cuisses et tibias fauves; stigma brun, l'aréole très large au sommet. — Long. : 6-7 mill.

Patrie : île de Ténériffe (Cabrera).

✓ **Heterischnus hispanicus**, nov. sp. — ♂ ♀. Corps très grêle. Face proéminente; tête noire, plus large que le thorax; mandibules à dents très inégales; clypéus fortement séparé de la face. Antennes grêles, fauves. Thorax, stigma et pieds roux; écusson convexe; métathorax à peine coudé, noir au moins à l'extrémité; aréa supéro-médiane carrée. Abdomen roux, subcylindrique; segments 2-4 carrés, 5-7 noirs; postpétiole lisse, roux chez la ♀, noir chez le ♂; gastrocèles nuls. — Long. : 7-8 mill.

Patrie : Ciudad-Real (Cabrera).